


<b>RÉPUBLIQUE TUNISIENNE</b> <b>MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION</b> <b>EXAMEN DU BACCALAURÉAT</b> <b>SESSION 2020</b>	<b>Session principale</b>	
	 Épreuve : <b>Mathématiques</b>	Section : <b>Mathématiques</b>
	Durée : <b>4h</b>	Coefficient de l'épreuve : <b>4</b>

§ § § § § §

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

La page 5/5 est à rendre avec la copie.

### Exercice 1 : (5 points)

Le plan est orienté.


Dans la figure ci-contre,  $ABC$  est un triangle direct, non rectangle et non isocèle.

$GAC$  et  $EBA$  sont des triangles directs, rectangles et isocèles respectivement en  $G$  et en  $E$ .

$L$ ,  $K$ ,  $I$  et  $J$  sont les milieux respectifs des côtés  $[BC]$ ,  $[GE]$ ,  $[EL]$  et  $[GL]$ .  $F$  et  $H$  sont les symétriques respectifs de  $G$  et  $J$  par rapport à  $L$ .

On note  $r_1$  et  $r_2$  les rotations de même angle  $\frac{\pi}{2}$

et de centres respectifs  $G$  et  $E$ .  $S_L$  désigne la symétrie centrale de centre  $L$ .



1) a) Déterminer  $r_2 \circ S_L \circ r_1(A)$ .

Caractériser  $r_2 \circ S_L \circ r_1$ .

b) En déduire que le triangle  $EFG$  est rectangle, isocèle.

c) Justifier que le quadrilatère  $LJKI$  est un carré.

2) Soit  $\varphi$  la symétrie glissante de vecteur  $\vec{LK}$  et d'axe  $\Delta$  passant par  $I$ .

On pose  $g = \varphi \circ S_{(LE)}$ , où  $S_{(LE)}$  est la symétrie orthogonale d'axe  $(LE)$ .

a) Montrer que  $\Delta = (IH)$ .

b) Montrer que  $g(J) = I$  et  $g(L) = E$ .

c) Prouver que  $g$  est la rotation de centre  $K$  et d'angle  $-\frac{\pi}{2}$ .

3) Soit  $f$  l'antidépacement qui envoie  $J$  en  $I$  et  $L$  en  $E$ .

a) Justifier que  $f$  est une symétrie glissante.

b) Donner les éléments caractéristiques de  $f$ .

4) Soit  $M$  un point du plan. Soient  $M'$  et  $M''$  les images de  $M$  respectivement par  $f$  et  $g$ .

Montrer que  $M'$  et  $M''$  sont symétriques par rapport à une droite fixe que l'on précisera.

## Exercice 2 : (4 points)

On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

Dans la figure 1 de l'annexe,  $(\Gamma)$  est le cercle de centre  $O$  et de rayon  $\sqrt{2}$ ,  $A, B$  et  $C$  sont les points d'affixes respectives  $1, i\sqrt{2}$  et  $-i\sqrt{2}$ .

Soit  $Q$  un point du cercle  $(\Gamma)$  d'affixe un nombre complexe  $a$ , distinct de  $i\sqrt{2}$  et  $-i\sqrt{2}$ .

- 1) On désigne par  $R$  le point d'affixe  $a + \bar{a}$ .
  - a) Vérifier que  $R \in (O, \vec{u})$ . Construire  $R$ .
  - b) Déterminer les nombres complexes  $a$  pour lesquels  $O, R$  et  $Q$  sont alignés.
- 2) Soit  $P$  le point du plan d'affixe  $ia$  et  $M$  un point d'affixe  $z$  non nul.
  - a) Justifier que  $P$  est l'image de  $Q$  par une rotation que l'on précisera. Construire  $P$ .
  - b) Montrer que  $A, P$  et  $M$  sont alignés  $\Leftrightarrow (i\bar{a} + 1)z + (ia - 1)\bar{z} = i(a + \bar{a})$ .
  - c) Montrer que  $(AP) \perp (OM) \Leftrightarrow (i\bar{a} + 1)z - (ia - 1)\bar{z} = 0$ .
  - d) Soit  $H$  le projeté orthogonal de  $O$  sur  $(AP)$ . On désigne par  $Z_H$  l'affixe du point  $H$ .

$$\text{Justifier que } Z_H = \frac{i(a + \bar{a})}{2(i\bar{a} + 1)}.$$

- 3) Soit  $N$  le point d'affixe  $Z_N = \frac{(a + \bar{a})}{(i\bar{a} + 1)}$ .
  - a) Vérifier que  $N$  est l'image de  $H$  par une similitude que l'on déterminera.
  - b) Construire le point  $N$ .
  - c) Déterminer l'ensemble sur lequel varie le point  $N$  lorsque  $Q$  varie sur le cercle  $(\Gamma)$  privé des points  $B$  et  $C$ .

## Exercice 3 : (4 points)

On considère la suite  $(a_n)$  définie sur  $\mathbb{N}$  par  $a_n = 2 \times 5^n + 7$ .

- 1)
  - a) Justifier que pour tout entier naturel  $n$ ,  $a_n$  est impair.
  - b) Déterminer suivant les valeurs de  $n$ , le reste modulo 8 de  $5^n$ .
  - c) En déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n \equiv 1 \pmod{8}$ .
- 2)
  - a) Montrer que si  $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{8} \\ x \equiv 7 \pmod{125} \end{cases}$  alors  $x \equiv 257 \pmod{1000}$ .
  - b) Montrer que pour tout  $n \geq 3$ ,  $a_n \equiv 257 \pmod{1000}$ .
  - c) Quels sont les trois derniers chiffres de  $(2 \times 5^{2020} + 7)(2 \times 5^{2021} + 7)$  ?
- 3)
  - a) Vérifier que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $5a_{2n} - a_{2n+1} = 28$ .
  - b) Soit  $d$  le PGCD de  $a_{2n}$  et  $a_{2n+1}$ . Montrer que  $d$  est différent de 7.
  - c) Trouver alors  $d$ .

### Exercice 4 : (7 points)

I. Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}$ .

On désigne par  $(\zeta)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  du plan  $P$ .

1) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et que pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = \frac{-e^{2x}}{(1+e^{2x})\sqrt{1+e^{2x}}}$ .

2) a) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

b) Vérifier que pour tout réel  $x$ ,  $0 < f(x) < 1$ .

3) a) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

b) Montrer que  $f$  réalise une bijection  $f^{-1}$  de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle  $J$  que l'on précisera.

c) Montrer que l'équation  $f(x) = x$  admet une unique solution  $\alpha$  telle que  $0,5 < \alpha < 0,6$ .

d) Déterminer le signe de  $f(x) - x$  pour tout réel  $x$ . Interpréter graphiquement le résultat.

4) Dans la figure 2 de l'annexe, on a construit la droite d'équation  $y = x$  et on a placé le réel  $\alpha$  sur l'axe des abscisses et le réel  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  sur l'axe des ordonnées.

a) Tracer la courbe  $(\zeta)$ .

b) Tracer la courbe  $(\zeta')$  de  $f^{-1}$ .

5) a) Montrer que la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = x - \ln(1 + \sqrt{1+e^{2x}})$  est une primitive de  $f$ .

b) On désigne par  $A$  l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe  $(\zeta)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives  $x = 0$  et  $x = \alpha$ .

Montrer que  $A = \alpha + \ln\left(\frac{\alpha(1+\sqrt{2})}{\alpha+1}\right)$ .

II. Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , on considère la fonction  $F_k$  définie sur  $[0, +\infty[$ , par  $F_k(x) = \int_0^x (f(t))^k dt$ .

1) a) Montrer que la fonction  $F_k$  est croissante sur  $[0, +\infty[$ .

b) Montrer que pour tout réel  $t \in [0, +\infty[$ ,  $0 \leq (f(t))^k \leq e^{-kt}$ .

c) En déduire que pour tout  $x \in [0, +\infty[$ ,  $0 \leq F_k(x) \leq \frac{1}{k}$ .

d) Montrer alors que la fonction  $F_k$  possède une limite finie  $l_k$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

e) Montrer que  $\lim_{k \rightarrow +\infty} l_k = 0$ .

2) a) En utilisant la question I.5.a) montrer que  $l_1 = -h(0)$ .

b) Montrer que pour tout réel  $t \in [0, +\infty[$ ,  $(f(t))^3 - f(t) = f'(t)$ .

c) En déduire que pour tout  $x \geq 0$ ,  $F_3(x) = F_1(x) + f(x) - f(0)$ .

d) Montrer que  $I_3 = \ln(1 + \sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

3) a) Montrer que pour tout  $x \geq 0$  et pour tout  $k \geq 2$ ,

$$F_{2k+1}(x) - F_{2k-1}(x) = \frac{1}{2k-1} \left( (f(x))^{2k-1} - (f(0))^{2k-1} \right).$$

b) En déduire que  $I_{2k+1} - I_{2k-1} = \frac{-1}{(2k-1)(\sqrt{2})^{2k-1}}$ ,  $k \geq 2$ .

c) Montrer que  $I_{2k+1} = I_3 - \sum_{m=2}^k \frac{1}{(2m-1)(\sqrt{2})^{2m-1}}$ ,  $k \geq 2$ .

d) En déduire  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{m=2}^k \frac{1}{(2m-1)(\sqrt{2})^{2m-1}}$ .

Section : ..... N° d'inscription : ..... Série : .....

Nom et Prénom : .....

Date et lieu de naissance : .....

Signatures des surveillants  
.....  
.....



**Épreuve: Mathématiques - Section : Mathématiques**  
**Session principale (2020)**  
**Annexe à rendre avec la copie**

Figure 1




Figure 2

